

SESSION DE 1992

**concours interne
de recrutement de professeurs agrégés
et concours d'accès à l'échelle de rémunération**

section : mathématiques

première épreuve de mathématiques

Durée : 6 heures

Calculatrice de poche, y compris programmable et alphanumérique, à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 86-228, du 28 juillet 1986.

L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique est rigoureusement interdit.

INTRODUCTION

En électronique, un élément à entrées et sorties multiples est appelé une boîte noire. Du point de vue mathématique, il peut être représenté par une matrice. Le groupement de deux boîtes noires \mathcal{A} et \mathcal{B} , correspondant à des matrices A et B , et branchées en parallèle, est équivalent à une boîte noire unique (\mathcal{C}, C) . On note $C = A : B$, et on dit que C est la somme parallèle de A et de B .

Dans la partie II du problème, on étudie l'application $(A, B) \rightarrow A : B$. On s'intéresse, dans la partie III, à une opération qui correspond, du point de vue physique, à la mise hors circuit de certaines parties d'un réseau électrique. La partie I est consacrée à des préliminaires.

NOTATIONS ET RAPPELS

Dans la suite, \mathbb{R} est le corps des nombres réels, et \mathbb{C} le corps des nombres complexes. On note \mathbb{R}_+ l'ensemble des nombres réels positifs ou nuls et, pour $\lambda \in \mathbb{C}$, $\bar{\lambda}$ est le nombre complexe conjugué de λ .

On désigne par E un \mathbb{C} -espace vectoriel hermitien de dimension finie non nulle n . Le produit scalaire de deux vecteurs x et y de E est noté $(x|y)$. L'application $(x, y) \rightarrow (x|y)$ vérifie donc, pour tous $x, y, z \in E$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$:

1. $(x|x) \in \mathbb{R}_+$, et $(x|x) = 0$ si et seulement si $x = 0$.
2. $(y|x) = \overline{(x|y)}$.
3. $(x + y|z) = (x|z) + (y|z)$.
4. $(x|y + z) = (x|y) + (x|z)$.
5. $(\lambda x|y) = \bar{\lambda} (x|y)$.
6. $(x|\lambda y) = \lambda (x|y)$.

La norme d'un vecteur x de E est définie par $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$.

On note \mathcal{L} l'algèbre des endomorphismes de E . Pour $f, g \in \mathcal{L}$, fg est le composé $f \circ g$, $\text{im}(f)$ l'image de f , et $\text{ker}(f)$ le noyau de f . La norme $\|f\|$ de f est définie par :

$$\|f\| = \sup \left\{ \frac{\|f(x)\|}{\|x\|}; x \in E, x \neq 0 \right\}.$$

Pour tout endomorphisme f de E , il existe un unique élément $f^* \in \mathcal{L}$, appelé adjoint de f , et tel que :

$$(f(x)|y) = (x|f^*(y))$$

pour tous $x, y \in E$. On rappelle que $(f^*)^* = f$.

Un élément de \mathcal{L} est dit hermitien s'il est égal à son adjoint. On note \mathcal{H} l'ensemble des endomorphismes hermitiens de E . On rappelle que, pour $f \in \mathcal{L}$, les conditions suivantes sont équivalentes :

7. $f \in \mathcal{H}$.

8. Il existe une base orthonormée de E formée de vecteurs propres pour f , et toutes les valeurs propres de f sont réelles.

Un élément de \mathcal{H} dont toutes les valeurs propres appartiennent à \mathbb{R}_+ est dit hermitien positif.

On note \mathcal{H}^+ l'ensemble des endomorphismes hermitiens positifs de E .

Pour $f, g \in \mathcal{H}^+$, on dit que g domine f , et on écrit alors $f \leq g$, si $g - f$ appartient à \mathcal{H}^+ .

Si F est un sous-espace vectoriel de E , on note F^\perp l'orthogonal de F dans E , et p^F la projection orthogonale de E sur F , autrement dit, la projection de E sur F parallèlement à F^\perp . On rappelle que p^F est un élément de \mathcal{H}^+ .

PARTIE I

Dans toute cette partie du problème, f , g et h désignent des endomorphismes de E . Les questions 1, 2 et 3 sont indépendantes.

1.a Soient i le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$, et y, z des vecteurs de E . Exprimer les produits scalaires :

$$(f(y+z) | y+z) \quad \text{et} \quad (f(y+iz) | y+iz)$$

en fonction de :

$$(f(y) | y), \quad (f(z) | z), \quad (f(y) | z), \quad (f(z) | y).$$

b. En déduire que les conditions suivantes sont équivalentes :

(C₁) f est nul.

(C₂) $(f(x) | x) = 0$ pour tout vecteur x de E . ~~ma~~

c. Prouver l'équivalence des conditions suivantes :

(C₃) $f \in \mathcal{H}$.

(C₄) $(f(x) | x) \in \mathbb{R}$ pour tout $x \in E$.

d. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

(C₅) $f \in \mathcal{H}^+$.

λ (C₆) $(f(x) | x) \in \mathbb{R}_+$ pour tout $x \in E$.

2. On suppose que $f \in \mathcal{H}^+$. Soit x un vecteur de E vérifiant :

$$(f(x) | x) = 0.$$

Prouver que $x \in \ker(f)$.

Tournez la page S.V.P.

3. L'endomorphisme f étant à nouveau quelconque, établir les égalités suivantes :

$$[\text{im}(f)]^\perp = \ker(f^*), \quad \ker(f) = [\text{im}(f^*)]^\perp.$$

4. Dans cette question, on suppose que f, g, h sont des éléments de \mathcal{H}^+ , et que h domine f .

a. En utilisant les questions I.1.d. et I.2., prouver que :

$$\ker(h) \subset \ker(f).$$

Déduire alors de la question I.3. que :

$$\text{im}(f) \subset \text{im}(h). \quad \text{ESC!}$$

b. Vérifier que $f + g$ est un endomorphisme hermitien positif de E dominant f et g . En déduire que :

$$\text{im}(f + g) = \text{im}(f) + \text{im}(g), \quad \ker(f + g) = \ker(f) \cap \ker(g).$$

5. a. On suppose que f est hermitien. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres. Établir :

$$\|f\| \stackrel{?}{=} \sup \{ |(f(x)|x)|; \|x\| = 1 \} = \max \{ |\lambda_k|; 1 \leq k \leq n \}.$$

ESC -

b. On suppose que g et h sont hermitiens positifs, et que h domine g . Prouver que :

$$\|g\| \leq \|h\|.$$

ESC.

PARTIE II

1. Dans cette question, f est un élément de \mathcal{H}^+ .

a. Soit (e_1, \dots, e_n) une base orthonormée de E formée de vecteurs propres pour f , avec les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$:

$$f(e_k) = \lambda_k e_k \quad (1 \leq k \leq n).$$

On définit un endomorphisme g de E par les formules :

$$g(e_k) = 0 \quad \text{si} \quad \lambda_k = 0, \quad g(e_k) = \frac{1}{\lambda_k} e_k \quad \text{si} \quad \lambda_k \neq 0.$$

Prouver que $g \in \mathcal{H}^+$, et que :

$$fg = gf = p^{\text{im}(f)}, \quad \text{im}(g) = \text{im}(f).$$

b. Montrer qu'il existe un et un seul élément de \mathcal{L} , que l'on notera f^\wedge , vérifiant les trois conditions suivantes :

(1) $f^\wedge \in \mathcal{H}^+$.

(2) $ff^\wedge = f^\wedge f = p^{\text{im}(f)}$.

(3) $\text{im}(f^\wedge) = \text{im}(f)$.

ESC.

c. Montrer que $\ker(f^\wedge) = \ker(f)$, et que $(f^\wedge)^\wedge = f$.

d. Soit F un sous-espace vectoriel de E . Prouver que $(p^F)^\wedge = p^F$. $\}$

Dans toute la suite du problème, pour f et g éléments de \mathcal{H}^+ , on note $f: g$ l'élément de \mathcal{L} défini par :

$$f: g = f(f + g) \wedge g.$$

Il est précisé que l'on a, en général :

$$(f + g) \wedge \neq f \wedge + g \wedge.$$

2. Soient f et g des éléments de \mathcal{H}^+ .

a. Établir l'identité suivante :

$$f: g = g: f + p^{\text{im}(f+g)} g - g p^{\text{im}(f+g)}.$$

b. En utilisant la question I.4.b., prouver que :

$$f: g = g: f.$$

En déduire l'inclusion :

$$\text{im}(f: g) \subset \text{im}(f) \cap \text{im}(g).$$

c. Soient x, y, z des éléments de E tels que :

$$x = f(y) = g(z).$$

Vérifier que :

$$x = (f: g)(y + z).$$

En déduire l'égalité :

$$\text{im}(f: g) = \text{im}(f) \cap \text{im}(g).$$

3. Soient f et g des endomorphismes hermitiens positifs de E , et x un vecteur de E .

a. On pose :

$$y = (f + g) \wedge g(x), \quad z = (f + g) \wedge f(x).$$

Vérifier l'égalité suivante :

$$((f: g)(x) | x) = (f(y) | y) + (g(z) | z). \quad \text{ESC}$$

En déduire que $f: g$ est un élément de \mathcal{H}^+ .

b. Vérifier que :

$$(f(x) | x) = ((f: g)(x) | x) + ((f + g) \wedge f(x) | f(x)). \quad \text{ESC}$$

En déduire que f domine $f: g$. Prouver alors, sans calcul, que g domine $f: g$.

4. Soient F et G des sous-espaces vectoriels de E . Établir l'égalité suivante :

$$2(p^F: p^G) = p^{F \cap G}. \quad \text{ESC}$$

5. Soient f et g des éléments de \mathcal{H}^+ .

a. Soient x, y, z des vecteurs de E vérifiant :

$$x = y + z.$$

Montrer que l'on a l'égalité suivante :

$$((f: g)(x) | x) = (f(y) | y) + (g(z) | z) - ((f + g) \wedge (g(z) - f(y)) | g(z) - f(y)).$$

b. Pour $x \in E$, on note $\mathcal{E}_x^{f,g}$ l'ensemble constitué des réels de la forme :

$$(f(y) | y) + (g(z) | z)$$

avec y, z éléments de E vérifiant $x = y + z$.

Prouver que le produit scalaire $((f: g)(x) | x)$ est le plus petit élément de l'ensemble $\mathcal{E}_x^{f,g}$. On pourra pour cela utiliser les vecteurs y_0 et z_0 définis par :

$$y_0 = (f + g) \wedge g(x) + p^{\text{ker}(f+g)}(x), \quad z_0 = (f + g) \wedge f(x).$$

6. Soient f, g, h, k des éléments de \mathcal{H}^+ . En utilisant la question II.5.b., établir les résultats suivants :

a. Si $f \leq g$, alors $f: h \leq g: h$.

b. $(f: h) + (g: k) \leq (f + g): (h + k)$.

c. $(f: g): h = f: (g: h)$.

PARTIE III

1. Soient $f \in \mathcal{H}^+$, et F un sous-espace vectoriel de E . Vérifier que $p^F f^\wedge p^F$ appartient à \mathcal{H}^+ .
 Pour tout élément f de \mathcal{H}^+ , et tout sous-espace vectoriel F de E , on définit un élément de \mathcal{H}^+ , noté f_F , par la formule :

$$f_F = (p^{F \cap \text{im}(f)} (f^\wedge) p^{F \cap \text{im}(f)})^\wedge.$$

2. Soient $f \in \mathcal{H}^+$, et F un sous-espace vectoriel de E .

a. En utilisant la question I.2., montrer que :

$$\ker((f_F)^\wedge) = \ker(f) + F^\perp.$$

En déduire que :

$$\text{im}(f_F) = F \cap \text{im}(f).$$

b. Montrer que, si $\text{im}(f) \subset F$, on a $f_F = f$.

3. Soient r un réel strictement positif, f un élément de \mathcal{H}^+ , et F un sous-espace vectoriel de E .

a. Vérifier que :

$$(f:rp^F) f^\wedge p^{F \cap \text{im}(f)} = (rp^F:f) f^\wedge p^{F \cap \text{im}(f)} = p^{F \cap \text{im}(f)} - \frac{1}{r} (f:rp^F) p^{F \cap \text{im}(f)}.$$

b. En déduire que :

$$(f:rp^F)(f_F)^\wedge = p^{F \cap \text{im}(f)} - \frac{1}{r} (f:rp^F).$$

c. Prouver l'égalité suivante :

$$f_F = (f:rp^F) + \frac{1}{r} (f:rp^F) f_F.$$

d. En déduire :

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \|f_F - (f:rp^F)\| = 0.$$

4. On munit l'ensemble \mathcal{H}^+ de la relation d'ordre \leq . Soient f, g des éléments de \mathcal{H}^+ , et F un sous-espace vectoriel de E . On désigne par $\mathcal{M}(f, F)$ l'ensemble des éléments h de \mathcal{H}^+ qui vérifient :

$$h \leq f \quad \text{et} \quad \text{im}(h) \subset F.$$

En utilisant la question III.3.d., établir les résultats suivants :

a. $f_F \leq f$.

b. Si $f \leq g$, on a $f_F \leq g_F$ et si, en outre, $\text{im}(f) \subset F$, alors $f \leq g_F$.

c. f_F est le plus grand élément de l'ensemble $\mathcal{M}(f, F)$.

5. Soient f et g des éléments de \mathcal{H}^+ , et F, G des sous-espaces vectoriels de E . En utilisant la question III.4.c., prouver les assertions suivantes :

a. $f_F + g_F \leq (f + g)_F$.

b. $(f_F)_G = (f_G)_F = f_{F \cap G}$.

c. $(p^F)_G = (p^G)_F = p^{F \cap G}$.

d. $(f_F):(g_F) = (f_F):g = (f:g)_F$.

6. Soient $f \in \mathcal{H}^+$, et F un sous-espace vectoriel de E .

a. Prouver que :

$$F \cap \text{im}(f - f_F) = \{0\}.$$

b. Soient g et h des éléments de \mathcal{H}^+ vérifiant les conditions suivantes :

$$f = g + h, \quad \text{im}(g) \subset F, \quad F \cap \text{im}(h) = \{0\}.$$

Montrer que :

$$g = f_F, \quad h = f - f_F.$$