

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront de façon importante dans l'appréciation des copies.

La calculatrice est autorisée pour ce DS

Exercice 1 :

1. $\alpha = \frac{141\pi}{4}$ n'appartient pas à $] -\pi; \pi]$

$$141 = 4 \times 35 + 1 \text{ donc } 141\pi = 4 \times 35 \times \pi + \pi \text{ donc } \alpha = 35\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$\text{donc } \alpha = 36\pi - \pi + \frac{\pi}{4} = 36\pi - \frac{3\pi}{4}$$

$$\text{or } -\frac{3\pi}{4} \in] -\pi; \pi] \text{ donc la mesure principale de } \alpha \text{ est } \boxed{-\frac{3\pi}{4}}$$

2. $\beta = \frac{-91\pi}{6}$ n'appartient pas à $] -\pi; \pi]$

$$91 = 6 \times 15 + 1 \text{ donc } -91\pi = -6 \times 15 \times \pi - \pi \text{ donc } \beta = -15\pi - \frac{\pi}{6}$$

$$\text{donc } \beta = -16\pi + \pi - \frac{\pi}{6} = -16\pi + \frac{5\pi}{6}$$

$$\text{or } \frac{5\pi}{6} \in] -\pi; \pi] \text{ donc la mesure principale de } \beta \text{ est } \boxed{\frac{5\pi}{6}}$$

3. $\gamma = 70$ n'appartient pas à $] -\pi; \pi]$ On cherche un entier relatif tel que $-\pi < 70 + 2k\pi \leq \pi$


$$-\pi < 70 + 2k\pi \leq \pi \iff -\pi - 70 < 2k\pi \leq \pi - 70 \iff \frac{-\pi - 70}{2\pi} < k \leq \frac{\pi - 70}{2\pi}$$

$$\text{or } \frac{-\pi - 70}{2\pi} \approx -11,6 \text{ et } \frac{\pi - 70}{2\pi} \approx -10,6$$

la seule valeur de k possible est donc $k = -11$

Donc la mesure principale de γ est $\boxed{70 - 22\pi}$

Exercice 2 :



Exercice 3 :

Dans tout l'exercice, k est un entier relatif.

1. (a) Le triangle ABC étant équilatéral alors une mesure de $(\widehat{AB}, \widehat{AC})$ est $\boxed{\frac{\pi}{3}}$

$$(b) (\widehat{BI}, \widehat{BA}) = (\widehat{BI}, \widehat{BC}) + (\widehat{BC}, \widehat{BA}) = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} + 2k\pi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad (\widehat{BI}, \widehat{BA}) = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$\text{donc une mesure de } (\widehat{BI}, \widehat{BA}) \text{ est } \boxed{-\frac{\pi}{6}}$$

(c) Le triangle AIB est isocèle en B donc $\widehat{BAI} = \widehat{BIA}$ et comme la somme des angles d'un triangle fait π radians, $\widehat{BAI} = \frac{1}{2} \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{5\pi}{12}$

donc une mesure de $(\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AB})$ est $\boxed{\frac{5\pi}{12}}$

(d) $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CJ}) = (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA}) + (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CJ}) = -\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{7\pi}{12} + 2k\pi$

donc une mesure de $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CJ})$ est $\boxed{\frac{7\pi}{12}}$

2. $(\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AJ}) = (\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AJ}) + 2k\pi = \frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{12\pi}{12} + 2k\pi = \pi + 2k\pi$

donc les points A, I et J sont alignés.

Exercice 4 : Dans tout l'exercice, k est un entier relatif.

$$(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA}) = (\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{CB}) + (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{BA}) + (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{DA}) + 2k\pi$$

donc

$$(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA}) = (-\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}) + (-\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) + (-\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) + 2k\pi = \pi + (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}) + (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) + (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) + 2k\pi$$

$$\text{donc } (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA}) = \pi + \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{37\pi}{24} + 2k\pi = \frac{13\pi}{24} + 2k\pi$$

donc la mesure principale de $(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DA})$ est $\boxed{\frac{13\pi}{24}}$

Exercice 5 :

$$\text{Résoudre } Q(x) = \frac{(6x + 8 - 2x^2)(3 - x)}{4x^2 - 12x + 9} \geq 0$$

Cherchons les valeurs qui annulent $4x^2 - 12x + 9$:

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x)^2 - 2(2x)(3) + 3^2 = (2x - 3)^2 \text{ donc } 4x^2 - 12x + 9 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$$

L'inéquation existe $\iff x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3}{2} \right\}$

Cherchons les valeurs qui annulent $3 - x$:

$$3 - x = 0 \iff x = 3$$

Cherchons les valeurs qui annulent $6x + 8 - 2x^2 = -2x^2 + 6x + 8$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 36 - 4(-2)(8) = 36 + 64 = 100 = 10^2 > 0$$

$\Delta > 0$ donc il y a deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 + 10}{-4} = -1$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 - 10}{-4} = 4$$

Tableaux des signes :

| x | $-\infty$ | -1 | $3/2$ | 3 | 4 | $+\infty$ | | | |
|------------------|-----------|------|-------|-----|-----|-----------|---|---|---|
| $6x + 8 - 2x^2$ | - | 0 | + | + | 0 | - | | | |
| $3 - x$ | + | + | + | 0 | - | - | | | |
| $4x^2 - 12x + 9$ | + | + | 0 | + | + | + | | | |
| $Q(x)$ | - | 0 | + | | + | 0 | - | 0 | + |

$$S = \left[-1; \frac{3}{2} \left[\cup \right] \frac{3}{2}; 3 \right] \cup [4; +\infty[$$